

La mue chez les oiseaux est un phénomène complexe et très variable d'une espèce à l'autre ?

par Richard Drolet

Saviez-vous que la mue, soit le fait de remplacer les vieilles plumes par des nouvelles, s'effectue chez tous les oiseaux au moins une fois par année ? Toutefois, le cycle et la synchronisation de la mue varient beaucoup d'une espèce à l'autre.

Chez nos canards barboteurs, par exemple (colvert, sarcelles et autres), le plumage nuptial vivement coloré des mâles au printemps sera remplacé en été par une livrée plus terne (plumage éclipse) se rapprochant davantage de celle des femelles. Chez les deux sexes, il y aura également perte simultanée des plumes rémiges responsables du vol. Ces oiseaux, incapables de voler pendant près d'un mois, se feront beaucoup plus discrets afin d'éviter la prédation.

Pour les espèces d'oiseaux qui conservent leur capacité à voler durant la mue, comme les rapaces par exemple, les rémiges des ailes seront remplacées une à une, ou quelques-unes à la fois, et ce, de façon symétrique, afin de ne pas altérer la capacité de vol de ces maîtres chasseurs.



Un phénomène un peu inusité de mue est rapporté chaque année par les amateurs de mangeoires d'oiseaux. Les oiseaux impliqués perdent simultanément leurs plumes sur la tête, ce qui leur confère une apparence chauve. Ce patron particulier de mue touche le geai bleu et le cardinal rouge. Le phénomène s'observe à la fin de l'été ou au début de l'automne. Certains avancent l'hypothèse que les oiseaux touchés seraient des juvéniles avant l'apparition de leur premier plumage d'hiver. Sur la photo ci-jointe, on observe un des deux geais bleus affectés sur le site de mes mangeoires. Tous deux avaient la même allure puis, en moins de trois semaines, leur coiffe était revenue à la normale.

Propriétaires de mangeoires, soyez à l'affût !